

腹証：両胸脇苦満 両腹直筋緊張 臍上悸

舌証：紅白苔乾～紅薄白苔で正常化

治療と経過：胃手術後のナルベに局注

初診 { 六君子湯2.5g 十全大補湯2.5g 2週  
大承気湯2.5g  
元気が出てきた。食欲も出てきた。皮膚症状改善す  
腰部と腹部のナルベに局注



再診：同 処方 2週

三診：同 処方 3週

治癒認め処方医に返す



S·Y



S-Y



S-Y



O・S 9才 小学4年 男性 149cm 37kg (IQ138)

主訴:夜尿症 手足多汗症 冷え症 神経症

現病歴:1才から夜尿あり、現在、小学4年生まで昼間の尿失禁あり  
オムツをして通学している。

小2年～3年生の1年間、東京某クリニック(泌尿器専門)  
にて抗生剤内服 抗利尿ホルモン点鼻するも無効。

冬になると足にしもやけ発症

習い事:合唱 将棋 英会話 水泳

現症:顔に紅班あり 夕方からあついと訴え体幹から上部に夜間  
発汗あり 2回着替える

寝付き寝起き良い 水分1～1.5ℓ 尿利4～5回 便秘(一)  
普通便

初診


頭36.1℃  
手24.0℃  
足20.0℃

4週後

頭36.7℃  
手25.0℃  
足24.0℃

舌証：紅 湿 無苔 静(+)

腹証：



治療と経過

小建中湯6.0g+抑肝散2.5g 4週

朝

夜

腎経に高周波照射

小建中湯3.0g 小柴胡湯2.5g

四逆散2.5g入浴前 6週

生まれて始めて夜尿と昼尿失禁(一)となる

小建中湯6.0g 小柴胡湯2.5g 6週

(朝・晩)

IQ138で天才的。陽気上昇 頭部に薬塗る。下半身 陽気不足 気がめぐらない  
気のめぐりをよくするため小柴胡湯で中焦を攪拌にして上下に通じさせる。

小建中湯：脾胃虚弱 神経症 夜尿症 疲労倦怠に用う(血瘦虚勞)

# O・S

## 治療前



## 治療後



## 足少陰腎經

**臣**は奴隸で、**又**は手、即ち**取**は奴隸の手であり、主人の身近にいつもいて常に守り役に徹する人、近衛部隊が必要なぐらいに、生命力とりわけ精力が著しく低下している段階である。解剖学上の腎臓ではなくて、副腎の機能障害ととらえる方がよい。

内外分泌の調和、心臓や腎機能の調整、泌尿生殖作用の調整、男女生殖器の正常化、血圧安定作用などの効果を腎経の薬物は有する。

症状で云えば、意識朦朧、痙攣、振戦、喘息、心臓痛、悪性高血圧、相当な低血圧または貧血、はなはだしい浮腫、脱汗、尿失禁、血尿、水様便などが該当する。

K・M 男性 79才 166cm 70kg BD112/60

初診日:X年7月

主訴:血小板減少症 貧血 DM腎症 乾癬

既病歴:鼻炎 喘息 H17年脳梗塞

現症:両下肢に出血性紫斑(+)

寝つき寝起き良い 水分2ℓ 尿利5~6 夜1回 便秘(一)軟便

硬い繰り返す タバコ(0)アルコール(0)昼間よく眠る 夜間テレビ観る

舌証:淡紅 裂 白苔 静(++)


腹証:臍上悸 左臍傍圧痛

治療と経過:茵・五苓散5.0g 桂枝茯苓丸5.0g 2週

オキサマイザー200g MZ ヒルトイド 紫雲膏

・帰膠・湯5.0g 通導散5.0g 4週

ヒルトイド



全身諸所 紫斑

温清飲5.0g 4週

右胸痛10日前 痛(+)切れない 10日前X-Pは小さい影あり 便秘 軟

口渇(+)息切れ(-)背中 紅班

柴陷湯5.0g 4週

四肢に皮疹(+)食後に↑透析間隔4

温清飲5.0g 桂枝茯苓丸5.0g サフラン0.5g

腎機能は改善 透析しない

紫斑(+)

茵・五苓散5.0g+黄耆10g(まずくて飲めない) 某大学Hpから温清飲出ている 4週

加味帰脾湯5.0g 牛車腎気丸5.0g+黄耆10g

K·M



I・T 女性 55才 153cm 45kg BD120/70

現症:接触性皮膚炎 両手背足背に苔せん 薬疹

手足多汗症 花粉症 手背ケロイド 便秘(+) 膵炎 金属アレルギー 腰椎分離症  
胃炎 胃潰瘍

寝つき寝起き良い 水分1ℓ 尿4~5 夜1回 便秘(-)普通便

生理28日5日間生理痛(-)量普通

3月頃、左眼の視力が落ちたのでコンタクトを作り変えようとして眼科  
受診、検査の結果順天に紹介される。

脳腫瘍(9cm)と診断され(良性)手術、術後3日間意識なし  
内服薬を服用す。

エクセグラン錠100ml タケプロン30mg リンデロン錠0.5mg  
ガスロンN OD錠 4mg

その後、薬疹が出て全身搔痒感あり 発疹 熱っぽい

舌証:舌 紅 湿

腹証:臍上悸

治療と経過

茵陳五苓散5.0g 消風散5.0g サフラン0.5g 1週

茵陳五苓散5.0g 竜胆瀉肝湯5.0g サフラン0.5g

四肢に紅班残る 2週



# 温度測定

|    | 治療前   | 治療後   |
|----|-------|-------|
| 手掌 | 24. 0 | 26. 0 |
| 足底 | 19. 0 | 23. 0 |

I · T

